

СПЕКТРА ТИЛ

раствор для орального применения



Вид животных и показания к применению

Относится к группе макролидных антибиотиков. Д. в. тилмикозина фосфат (300 мг тилмикозина фосфата в 1 мл раствора). Обладает выраженной активностью в отношении *Mycoplasma gallisepticum*, *M. Synoviae*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma bovis*, *M. dispar*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, а также других микроорганизмов, чувствительных к тилмикозину.

Способ применения и дозы

Орально с питьевой водой.

Цыплята и индюки: 30 мл / 100 л воды (75 мг тилмикозина/л воды) в течение 3-х дней. Цыплята: 15–20 мг тилмикозина/кг, индюки: 10–27 мг тилмикозина/кг живого веса.

Телята: 1 мл / 20 кг живого веса два раза в день в течение 3–5 дней (12,5 мг тилмикозина/кг живого веса).

Свиньи: 80 мл / 100 л воды (200 мг тилмикозина/л воды) в течение 5 дней (15–20 мг тилмикозина/кг живого веса).

Период ожидания

Цыплята — 12 дней; индюки — 19 дней; телята — 42 дня; свиньи — 14 дней.